

Link do produktu: <http://sklep.agroratajczak.pl/superdiar-zaburzenie-trawienia-drobieu-bydla-trzody-golebi-comfeed-100g-p-166.html>



SUPERDIAR zaburzenie trawienia drobieu bydła trzody gołębi Comfeed 100g

Cena

18,00 zł

Opis produktu

SuperDiar Comfeed

- ogranicza występowanie biegunek
- stabilizuje trawienie
- osłania przewód pokarmowy
- zapobiega odwodnieniu
- dostarcza łatwo wchłanialnej energii

Zalecenia do stosowania- zaburzenia trawienia (niestrawności, biegunki u bydła, trzody, drobieu i gołębi), zmiany żywienia.

Opis działania- szybko stabilizuje pracę przewodu pokarmowego. Pektyny, skrobia oraz śluzy i błonnik z babki jajowatej, pochłaniają duże ilości wody, pęcznieją tworząc warstwę osłaniającą jelita. Węgiel roślinny i naturalne taniny osłabiają działanie bakterii szkodliwych, tworzą kompleksy z toksynami i powodują ich usuwanie z przewodu pokarmowego. Łatwo przyswajalna energia utrzymuje cielę w dobrej kondycji, a elektrolity ograniczają odwodnienie.

INSTRUKCJA PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA:

Podawać po pojawieniu się pierwszych objawów biegunki, aż do ich ustąpienia.

- **CIEŁĘTA Z BIEGUNKĄ:** 100g 2x/dzień w 2L ciepłej wody lub mleka (temp. 38°C).

STANY ZAGROŻENIA: 50g 1x/dzień zmieszać z wodą, mlekiem (temp. 38°C). Zwykle podawanie preparatu przez 1-2 dni jest wystarczające. W razie potrzeby można podawać przez kilka kolejnych dni.

NIE MA POTRZEBY PRZERYWAĆ PODAWANIA MLEKA

UWAGA: Po zmieszaniu preparatu z wodą lub mlekiem podać w ciągu 15min.

- **BYDŁO - MŁODE I DOROSŁE:** 0,2g/kg m.c. tj. 40-160g/szt./dzień przez 2-3 dni.
- **KROWY MLECZNE:** 100g/szt./dzień przez 2-3 dni.
- **TRZODA - PROSIĘTA I WARCHLAKI:** 0,2g/kg m.c./dzień tj. 2-4kg na 1T paszy przez 5-7 dni. Zapobiegawczo w okresie odsadzenia (14-21 dzień życia): 3,5kg na 1T paszy.
- **MACIORY I TUCZNIKI:** 0,2 g/kg m.c./dzień tj. 2-3,5kg na1T paszy przez 7-10 dni.
- **DRÓB:** 0,5-1,5kg na 1T paszy przez 5-7 dni.
- **GOŁĘBIE:** 5g na 1kg paszy przez 3-5dni.

OKRES KARENCJI: brak

Dostępne opakowania: **100g.**

Przed zastosowaniem wskazana konsultacja z lek. wet. lub specjalistą ds. żywienia.
